

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Xavier BLIN, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: COMPOSITION CONTAINING AN OILY PHASE AND A NAPHTHOPYRAN DYE, COSMETIC TREATMENT PROCESSES

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

☒ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):

Application No.

Date Filed

60/426,376

November 15, 2002

60/426,411

November 15, 2002

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

France

02 13003

October 18, 2002

France

02 13004

October 18, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

☒ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

☐ were filed in prior application Serial No. filed

☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number

Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and

☐ (B) Application Serial No.(s)

☐ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Richard L. Treanor

Registration No. 36,379

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 09 SEP. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260399

REMISE DES PIÈCES DATE 18 OCT 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0213003 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 18 OCT. 2002 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE L'OREAL Catherine DODIN - D.I.P.I 6, rue Bertrand Sincholle 92585 CLICHY cedex France	
V s références pour ce dossier (facultatif) OA02312/CD			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date ____/____/____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition cosmétique comprenant une phase huileuse et un colorant de type naphthopyranne, et procédés de traitement cosmétique			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suit »	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		L'ORÉAL	
Prénoms			
Forme juridique		SA	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Adresse	Rue	14, rue Royale	
	Code postal et ville	75008	PARIS
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		01.47.56.83.73	
N° de télécopie (facultatif)		01.47.56.73.88	
Adresse électronique (facultatif)			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 18 OCT 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0213003 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI		DB 540 W / 260899	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>			OA02312/CD		
6 MANDATAIRE					
Nom			DODIN		
Prénom			Catherine		
Cabinet ou Société			L'ORÉAL		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
Adresse	Rue	6 rue Bertrand Sincholle			
	Code postal et ville	92585	CLICHY Cedex		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			01.47.56.83.73		
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			01.47.56.73.88		
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>					
7 INVENTEUR (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs			<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée		
8 RAPPORT DE RECHERCHE			Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance			Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES			Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Catherine DODIN 18 Octobre 2002				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention a trait à de nouvelles compositions cosmétiques, et notamment de nouvelles compositions de maquillage, comprenant des colorants organiques notamment photochromes.

- 5 Les compositions de maquillage telles que les poudres libres ou compactes, les fonds de teint, les fards à joues ou à paupières ou les rouges à lèvres, sont généralement constituées d'un véhicule approprié et d'un ou plusieurs agents de coloration destinés à conférer une certaine couleur auxdites compositions avant et/ou après leur application sur la peau, les muqueuses, les semi-muqueuses et/ou les
- 10 phanères telles que les ongles ou les cheveux.
- Pour créer des couleurs, on utilise aujourd'hui une gamme d'agents de coloration assez limitée comprenant notamment des laques, des pigments minéraux, des pigments organiques et des pigments nacrés. Les laques permettent d'obtenir des couleurs vives, mais pour la plupart sont instables à la lumière, à la température
- 15 ou au pH. Certaines présentent également l'inconvénient de tacher la peau de manière disgracieuse après application, par dégorgement du colorant. Les pigments minéraux, en particulier les oxydes minéraux sont au contraire très stables mais donnent des couleurs plutôt ternes et pâles. Les pigments nacrés quant à eux permettent d'obtenir des couleurs variées mais peu intenses, qui conduisent à des effets irisés mais le plus souvent assez faibles.
- 20 Dans le domaine de la coloration capillaire temporaire ou fugace, qui donne lieu à une modification légère de la couleur naturelle de la chevelure qui tient d'un shampoing à l'autre et qui sert à embellir ou corriger une nuance déjà obtenue, on a déjà proposé une coloration avec des pigments usuels pour apporter un reflet temporaire aux cheveux, mais les nuances obtenues par cette coloration restent assez ternes, trop uniformes et peu ludiques. On peut notamment assimiler une telle coloration à un "maquillage" des cheveux.
- 25 Depuis peu, il est également proposé d'utiliser des composés photochromes dans les compositions de maquillage ou capillaire, de manière à obtenir des changements agréables, ludiques et variables dans le 'rendu couleur' des maquillages de la peau et/ou des cheveux.
- 30 Les composés photochromes sont des composés qui possèdent la propriété de changer de couleur lorsqu'ils sont irradiés par une source lumineuse, puis de reprendre leur couleur initiale, ou une couleur proche, lorsque l'on arrête l'irradiation. De tels composés trouvent notamment une application particulièrement intéressante dans les compositions cosmétiques, en particulier dans les compositions de maquillage telles que les fonds de teint, les fards à joues ou à paupières et les rouges à lèvres
- 35 En effet, on a constaté que le 'rendu maquillage' d'une peau maquillée est différent selon que l'on se trouve en éclairage naturel ou en éclairage artificiel. Ainsi, un maquillage réalisé en éclairage artificiel paraîtra plus clair en lumière naturelle. A l'inverse, un maquillage réalisé à l'extérieur paraîtra plus sombre dans un endroit éclairé artificiellement.
- 40

Pour pallier ce problème, il a été proposé, par exemple par le brevet EP359909, des compositions cosmétiques comprenant des composés photochromes minéraux particulier, choisis parmi les oxydes métalliques, leurs hydrates et leurs complexes. En particulier, ce document mentionne l'utilisation d'oxyde de titane traité de manière à le rendre photochrome, dans des compositions de maquillage telles que des poudres et des fonds de teint.

Toutefois, on a constaté que ces composés photochromes minéraux, bien qu'ils permettent d'obtenir un maquillage qui semble rester de couleur constante quel que soit l'éclairage, ne permettent toutefois pas d'obtenir un véritable changement de la couleur du maquillage, ou, en d'autres termes, un véritable changement du 'rendu maquillage'.

D'autre part, on a également constaté qu'après l'arrêt de l'irradiation lumineuse, la couleur du maquillage ne revenait pas toujours d'une manière acceptable à sa couleur initiale, en particulier qu'elle ne revenait pas complètement à une couleur identique à ladite couleur initiale et/ou pas de manière assez rapide.

Il a également été proposé d'utiliser des composés photochromes organiques, tels que les composés de la famille des spiropyranes ou des naphthooxazines. Ces composés photochromes sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils permettent d'obtenir un changement rapide de coloration du support sur lequel ils sont appliqués, lorsque ledit support est exposé aux UV par exemple, avec un retour rapide à la couleur initiale lorsque l'exposition aux UV cesse. On peut ainsi citer le brevet FR1604929 qui décrit des compositions cosmétiques notamment capillaires sous forme d'aérosol, qui contiennent des composés phototropes tels que des nitrobenzylpyridines, des thiosemicarbazones ou des dérivés de spiropyranes. Après sprayage de ces compositions sur les cheveux et exposition à la lumière du soleil, on obtient une coloration bleu-violet qui redevient jaune pâle dans l'obscurité.

On connaît également par EP970689 un produit cosmétique de maquillage comprenant des première et seconde compositions conditionnées séparément, la première composition contenant un agent de coloration photochrome susceptible de produire au moins une couleur en présence d'UV et la seconde composition contenant au moins un filtre UV. Toutefois, la dynamique de ces compositions est faible : notamment, le retour à l'état initial se fait lentement.

On connaît également par la demande WO02/078665, une composition cosmétique comprenant des matières colorantes liquides, absorbeurs d'UV, de type naphthopyranes ou naphthoxazines, et qui sont encapsulées dans une capsule à base de copolymères acrylates, et qui peuvent être employées dans le but d'absorber les UV. Toutefois, il n'y est nullement fait mention d'une quelconque propriété photochrome de ces compositions ou matières colorantes.

La présente invention a pour but de proposer de nouvelles compositions cosmétiques présentant de nombreux avantages par rapport à celles de l'art antérieur, grâce à l'utilisation de colorants organiques particuliers.

Ainsi, les compositions cosmétiques selon l'invention permettent l'obtention d'un maquillage susceptible d'un changement de couleur rapide en fonction de la nature et/ou de l'intensité de la lumière.

- 5 L'utilisation des colorants photochromes selon l'invention permet également d'obtenir un maquillage de couleur nette et pure, avec un 'rendu maquillage' qui paraît plus intense.

Le changement de couleur obtenu à l'aide de ces colorants est rapide; il est également réversible et permet de revenir, après l'arrêt de l'irradiation par une source lumineuse, à la couleur initiale, et ce également de manière rapide.

10 Par ailleurs, il est ainsi possible d'utiliser, dans la composition cosmétique selon l'invention, une quantité de colorants photochromes plus faible que celle généralement utilisée dans l'art antérieur, par exemple de l'ordre de 0,01 à 2% en poids, tout en obtenant un effet de maquillage et une transparence comparables.

15 En outre, les bonnes propriétés cosmétiques des compositions selon l'invention sont maintenues.

De plus, bien que de structure chimique proche, les colorants photochromes selon l'invention présentent une grande variété de couleur qui peut aller du rouge au bleu en passant par le gris, avec des variations plus ou moins foncées. Ceci permet notamment une formulation plus aisée desdits colorants, ne nécessitant pas, pour chaque modification de teinte, une adaptation de la composition.

En outre, on a constaté de manière surprenante que selon la polarité de l'huile ou du mélange d'huiles formant la phase huileuse de la composition cosmétique, il est possible de moduler la couleur de la composition initiale, avant irradiation.

25 Ainsi, lorsque la phase huileuse est polaire ou plutôt polaire, elle présente en présence des colorants photochromes selon l'invention une coloration qui peut aller, par exemple, du rose clair au violet en passant par l'orangé, en fonction bien évidemment de la nature chimique du colorant, de sa quantité, ainsi que, notamment, de la polarité et de la nature chimique de ladite phase huileuse.

30 Lorsque la phase huileuse est plutôt apolaire ou faiblement polaire, on a constaté que sa couleur n'est que peu ou pas perturbée par la présence des colorants photochromes avant irradiation; la phase huileuse reste quasiment incolore.

Les colorants photochromes selon l'invention sont donc également solvatochromes, c'est-à-dire qu'ils changent de couleur en fonction de la nature (polarité) du solvant dans lequel ils se trouvent.

35 Ceci permet par exemple notamment d'obtenir un produit cosmétique photochrome complètement incolore sans excitation UV, puis un effet tranché (incolore / coloré) après irradiation.

40 De plus, si la composition est pigmentée par ailleurs, l'absence de couleur apportée par le colorant photochrome selon l'invention permet de ne pas perturber la couleur initiale.

On peut également obtenir un produit cosmétique photochrome légèrement coloré sans UV, ce qui peut permettre d'en visualiser le dépôt et d'en faciliter l'application avant excitation et intensification de la couleur.

- 5 Grâce aux colorants notamment photochromes et solvatochromes selon l'invention, il est possible non seulement de moduler la couleur conférée par une composition cosmétique comprenant lesdits colorants, par irradiation (photochromisme) mais également de moduler la couleur de la composition initiale, avant irradiation.

10

Un objet de la présente invention est donc une composition cosmétique comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins une phase huileuse et au moins un colorant de formule telle que définie ci-après.

15


L'invention a également pour objet un procédé de traitement cosmétique d'un support choisi parmi les muqueuses, les semi-muqueuses, la peau et/ou les phanères, dans lequel on applique sur ledit support une composition cosmétique telle que définie ci-dessus.

20


En particulier, l'invention a pour objet un procédé de maquillage et/ou de coloration temporaire d'un support choisi parmi les muqueuses, les semi-muqueuses, la peau et/ou les phanères, dans lequel on applique sur ledit support une composition cosmétique telle que définie ci-dessus.

25

Les colorants organiques selon l'invention sont des naphtopyrannes, et notamment des 3H-naphto-[2,1-b]-pyrannes qui peuvent être représentés par la formule (I) ou des 2H-naphto-[1,2-b]-pyrannes qui peuvent être représentés par la formule (II) :



(I)




(II)

30


dans lesquelles :

* R1 représente :

- (i) un atome d'hydrogène;
 - (ii) un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, voire 1-6, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;
 - (iii) un cycle hydrocarboné formé avec l'une des liaisons "f" ou "gh" et le radical R7; ou
 - (iv) un groupement choisi parmi $-\text{COOR}_4$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_2\text{R}_3$, $-\text{NR}_2\text{R}_3$, $-\text{OR}_4$ et $-\text{SR}_4$, dans lequel :
 - R2 et R3 soit représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-12, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P,
 - soit pris ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont reliés, forment un hétérocycle hydrocarboné, saturé ou insaturé, comportant 3-10, de préférence 4-6, atomes de carbone et éventuellement 1-5 autres hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, ledit cycle étant éventuellement substitué par au moins un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, comportant éventuellement 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;
 - R4 représente un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-12, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl, et/ou éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;
- * R5 et R6 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi :
- (i) les groupements aminoaryles cycliques saturés de formule (IIa) ou (IIb) :




(IIa)



(IIb)

dans lesquelles le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 3 à 30 atomes, de préférence 4-10 et encore mieux 5, 6 ou 7 atomes, inclus l'azote, le reste étant des atomes de carbone et/ou des hétéroatomes choisis parmi O, S, Si, P et/ou des groupements choisis parmi -NH et -NR avec R représentant un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

- (ii) les groupements indolinoaryles de formule (III) :




(III)

dans laquelle R10 et R11 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, voire 1-6, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par FI, Br et/ou Cl; (ii) les atomes d'halogène, et notamment FI, Br et/ou Cl; (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); (iv)



un atome d'hydrogène; (v) un groupement choisi parmi $-C(O)NR_2R_3$, $-NR_2R_3$, $-OR_4$ ou $-SR_4$ avec R_2 , R_3 et R_4 ayant les significations données ci-dessus; (vi) les radicaux R_{10} et R_{11} pouvant former ensemble un cycle hydrocarboné saturé ou insaturé ayant au total 5 à 8 atomes (incluant les atomes du cycle indoline), lesdits atomes étant choisis parmi C, O, S et/ou NR avec R représentant H ou un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, voire 1-12, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P,

10 - (iii) les groupements de formule (IV) :




15 dans laquelle m et p sont, indépendamment l'un de l'autre, des entiers allant de 2 à 5;

- (iv) les groupements aminoaryles cycliques insaturés de formules (Va), (Vb) ou (Vc) :



20



(Vc)

dans lesquelles R8 et R9, représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, voire 1-6, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl; (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl; (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); (iv) un atome d'hydrogène; (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;

- (v) un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 2-18, et mieux 3 à 12, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P; et notamment un groupement choisi parmi -C₆H₄-CONR₂R₃, -C₆H₄-NR₂R₃ et -C₆H₄-OR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;

* R7 représente un groupement choisi parmi :

- (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;
- (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl;
- (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); -N=N- (azo); =NH (imino); -CONH₂ (amide);
- (iv) un atome d'hydrogène;
- (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;
- (vi) le radical R7 pouvant en outre former, avec l'une des liaisons "i", "j", "k", ou "g,h" prises avec le radical R1, ou "f" prise avec le radical R1, un cycle hydrocarboné saturé ayant au total 3 à 8, de préférence 4 à 7, et mieux 5 ou 6, atomes de carbone, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;


* R'1 représente un groupement choisi parmi :

- (i) un atome d'hydrogène;
- (ii) un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;
- (iii) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ et -SR₄, avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;


* R'2 représente un groupement choisi parmi :

- (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;
- (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl;
- (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); -N=N- (azo); =NH (imino); -CONH₂ (amide);
- (iv) un atome d'hydrogène;
- (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus.

De préférence, les colorants organiques selon l'invention répondent à l'une des formule (Ia) et (IIa) suivantes :



(Ia)



(IIa)

dans lesquelles R₁, R₅, R₆, R₇, R'1 et R'2 sont définis tels que précédemment.

De préférence, R₁ représente un atome d'hydrogène; un cycle hydrocarboné avec l'une des liaisons "f" ou "gh" et le radical R₇; ou un groupement choisi parmi -COOR₄, -NR₂R₃, -OR₄ et -SR₄, dans lequel :


- R₂ et R₃ soit représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-12, et mieux 1 à 6, atomes de

carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, soit pris ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont reliés, forment un hétérocycle hydrocarboné, saturé ou insaturé, comportant 3-10, de préférence 4-6, atomes de carbone et éventuellement 1-5 autres hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, ledit cycle étant éventuellement substitué par au moins un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, comportant éventuellement 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

- R4 représente un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl, et/ou éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P.

De préférence R5 et R6 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi :

- les groupements aminoaryles cycliques saturés de formule (IIa) ou (IIb) :



(IIa)

(IIb)

dans lesquelles le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 3 à 30 atomes, de préférence 4-10 et encore mieux 5, 6 ou 7 atomes, inclus l'azote, le reste étant des atomes de carbone et/ou des hétéroatomes choisis parmi O, S, Si, P et/ou des groupements choisis parmi -NH et -NR avec R représentant un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

- un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 2-18, et mieux 3 à 12, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuel-

lement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P; et notamment un groupement choisi parmi $-C_6H_4-CONR_2R_3$, $-C_6H_4-NR_2R_3$ et $-C_6H_4-OR_4$ avec R_2 , R_3 et R_4 ayant les significations données ci-dessus;

- 5 De préférence, R_7 représente un groupement choisi parmi :
- (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par Fl , Br et/ou Cl ;
 - 10 - (ii) les atomes d'halogène, et notamment Fl , Br et/ou Cl ;
 - (iii) les groupements $-CN$ (nitrile), $-COOH$ (carboxylate), $-NO_2$ (nitro); $-N=N-$ (azo); $=NH$ (imino); $-CONH_2$ (amide);
 - (iv) un atome d'hydrogène;
 - (v) un groupement choisi parmi $-NR_2R_3$, $-OR_4$ ou $-SR_4$ avec R_2 , R_3 et R_4
 - 15 ayant les significations données ci-dessus;
 - (vi) le radical R_7 pouvant en outre former, avec l'une des liaisons "i", "j", "k", ou "g,h" prises avec le radical R_1 , ou "f" prise avec le radical R_1 , un cycle hydrocarboné saturé ayant au total 3 à 8, de préférence 4 à 7, et mieux 5 ou 6, atomes de carbone, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S,
 - 20 Si et P.


De préférence, R'_1 représente l'hydrogène ou un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par Fl , Br et/ou Cl .

De préférence, R'_2 représente l'hydrogène ou un groupement choisi parmi $-NO_2$, $-NR_2R_3$ et $-C(O)NR_2R_3$, dans lesquels R_2 et R_3 , soit représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-12, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P; soit pris ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont reliés, forment un hétérocycle hydrocarboné, saturé ou insaturé, comportant 3-10, de préférence 4-6, atomes de carbone et éventuellement 1-5 autres hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, ledit cycle étant éventuellement substitué par au moins un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, comportant éventuellement 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P.

40 On peut plus particulièrement citer les colorants organiques de formule (I) ou (Ia) pour lesquelles :


* R_1 représente l'hydrogène; ou un groupement $-COOR$ avec R étant un radical

hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle; ou un groupement




et/ou

- 5 * R5 et R6 représentent, indépendamment l'un de l'autre, soit (i) un groupement de formule (IIa) :




(IIa)


- 10 dans laquelle le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 4 à 7 atomes, notamment 5 ou 6 atomes, inclus l'azote, et notamment 3-5 atomes de carbone et 0-1 atome d'oxygène; et en particulier un groupement de formule:



ou




ou




15


soit (ii) un groupement hydrocarboné ayant 5 à 14, de préférence 6 à 10 atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 2 hétéroatomes choisis parmi N, O ou S; en particulier un groupement



ou



ou



20

dans lesquelles R est un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle; et R2 et R3 sont, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cycli-

que, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

et/ou


- 5 * R7 représente un atome d'hydrogène ou un groupement -NR₂R₃, avec R₂ et R₃ représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné saturé, linéaire ou ramifié, ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un groupement méthyle et/ou éthyle.

- 10 On peut également citer les colorants organiques de formule (II) ou (IIa) pour lesquelles :


* R'₁ représente l'hydrogène ou un groupement -COOR avec R étant un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle;

et/ou

- 15 * R₅ et R₆ représentent, indépendamment l'un de l'autre, soit (i) un groupement de formule (IIa) :




- 20 dans laquelle le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 4 à 7 atomes, notamment 5 à 6 atomes, inclus l'azote, et notamment 4-5 atomes de carbone et 0-1 atome d'oxygène; et en particulier un groupement de formule:



25

soit (ii) un groupement hydrocarboné ayant 5 à 14, de préférence 6 à 10 atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 2 hétéroatomes choisis parmi N, O ou S;


en particulier un groupement :



dans lesquelles R est un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle; et R₂ et R₃ sont, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;


et/ou

* R'₂ représente l'hydrogène, ou un groupement -NR'R'' avec R' et R'', identiques ou différents, représentant un groupement hydrocarboné saturé, linéaire ou ramifié, ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un groupement méthyle et/ou éthyle; ou un groupement




Parmi ces colorants organiques, on peut citer ceux décrits dans les demandes WO94/22850, WO98/45281 et WO00/18755.

On peut notamment citer les composés suivants, plus particulièrement préférés :
- le 3,3-di(4-méthoxyphényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :




- le 3-phényl-3-(4-morpholinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :




- le 3-phényl-3-(4-pipéridinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :

5




- le 3-phényl-3-(4-pipéridinophényl)-6-carboxyméthyl-9-N-diméthyl-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :

10



- le 2-phényl-2-(4-piperidinophényl)-5-carboxyméthyl-9-N-diméthyl-2H-naphto[1,2-b]pyran de formule :

15



- leurs mélanges.

- 5 Les colorants organiques selon l'invention sont de préférence compris, seul ou en mélange, en une quantité de 0,001 à 20% en poids, notamment de 0,005 à 10 % en poids, de préférence 0,01 à 5% en poids, et encore mieux de 0,05 à 2% en poids, préférentiellement de 0,1 à 1% en poids, par rapport au poids total de la composition cosmétique.
- 10 De préférence, ces colorants organiques sont photochromes, c'est-à-dire qu'ils présentent un ΔE supérieur ou égal à 5, de préférence supérieur ou égal à 10, mieux supérieur ou égal à 25, encore mieux supérieur ou égal 35, voire supérieur ou égal à 45; le ΔE est mesuré de la manière définie avant les exemples.
- 15 Avantageusement, les colorants organiques selon l'invention sont solubles ou éventuellement dispersibles dans au moins une des phases de la composition qui les comprend.
- 20 La composition selon l'invention comprend en outre une phase huileuse qui peut comprendre une ou plusieurs huiles cosmétiquement acceptables.
Par huile cosmétiquement acceptable selon l'invention, on entend tout corps gras liquide à 25°C, 1 atm, et ayant un poids moléculaire supérieur ou égal à 160, notamment compris entre 170 et 10^6 , voire entre 200 et $5 \cdot 10^5$, compatible avec une
- 25 application sur la peau, les muqueuses (lèvres) et/ou les phanères (ongles, cils, sourcils, cheveux).
De préférence, la phase huileuse est macroscopiquement homogène, c'est-à-dire homogène à l'œil nu.
- 30 La phase huileuse peut comprendre une ou plusieurs huiles, qui peuvent être polaires ou apolaires, volatiles ou non volatiles, et de préférence, hydrocarbonées.
- 35 On entend par huile polaire, une huile composée de composés chimiques comportant au moins un groupement polaire. Les groupements polaires sont bien connus de l'homme du métier : il peut s'agir notamment de groupement de type alcool, ester ou acide carboxylique.

En particulier, on peut définir les huiles polaires selon l'invention comme ayant un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, de : $\delta_a \geq 5,0 \text{ (J/cm}^3)^{1/2}$.

- 5 Les huiles polaires comprennent les huiles plutôt polaires qui ont un paramètre moyen de solubilité à 25°C de : $5,0 \leq \delta_a \leq 7,0 \text{ (J/cm}^3)^{1/2}$, et les huiles franchement polaires qui ont un paramètre moyen de solubilité à 25°C de : $\delta_a > 7,0 \text{ (J/cm}^3)^{1/2}$.

- De la même manière, les huiles apolaires au sens de l'invention ont un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, de :
10 $0 \leq \delta_a < 5,0 \text{ (J/cm}^3)^{1/2}$.

Les huiles apolaires au sens de l'invention comprennent les huiles franchement apolaires ($\delta_a = 0$) et les huiles peu polaires qui ont un paramètre moyen de solubilité à 25°C de : $0 < \delta_a < 5,0 \text{ (J/cm}^3)^{1/2}$.

- 15 Ainsi, plus la valeur de δ_a est élevée, plus la polarité de l'huile est élevée.

La définition et le calcul des paramètres de solubilité dans l'espace de solubilité tridimensionnel de HANSEN sont décrits dans l'article de C. M. HANSEN : "The three dimensional solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

- 20 Selon cet espace de Hansen :

- δ_D caractérise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipôles induits lors des chocs moléculaires ;

- δ_p caractérise les forces d'interactions de DEBYE entre dipôles permanents ainsi que les forces d'interactions de KEESOM entre dipôles induits et dipôles permanents;
25

- δ_h caractérise les forces d'interactions spécifiques (type liaisons hydrogène, acide/base, donneur/accepteur, etc.) ;

- δ_a est déterminé par l'équation : $\delta_a = (\delta_p^2 + \delta_h^2)^{1/2}$

Les paramètres δ_p , δ_h , δ_D et δ_a sont exprimés en $(\text{J/cm}^3)^{1/2}$.

- 30 Lorsque la phase huileuse est un mélange de différentes huiles, les paramètres de solubilité du mélange sont déterminés à partir de ceux des composés pris séparément, selon les relations suivantes :

$$\delta_{D\text{mel}} = \sum_i x_i \delta_{Di} \quad ; \quad \delta_{p\text{mel}} = \sum_i x_i \delta_{pi} \quad \text{et} \quad \delta_{h\text{mel}} = \sum_i x_i \delta_{hi}$$

- 35 $\delta_{a\text{mel}} = (\delta_{p\text{mel}}^2 + \delta_{h\text{mel}}^2)^{1/2}$

où x_i représente la fraction volumique du composé i dans le mélange.

Il est à la portée de l'homme du métier de déterminer les quantités de chaque huile pour obtenir une phase huileuse satisfaisant aux critères souhaités.

- 40 Selon un premier mode préféré de réalisation de l'invention, la phase huileuse est polaire et peut comprendre principalement, voire exclusivement, une ou plusieurs huiles polaires (plutôt ou franchement polaires) en mélange, qui peuvent donc représenter 5 à 100% en poids, notamment 10-90%, voire 15-60% et encore



mieux 20-50% en poids du poids total de ladite phase huileuse.

Selon ce premier mode préféré, la phase huileuse polaire présente un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, supérieur ou égal à 5,0 (J/cm³)^{1/2}, notamment supérieur ou égal à 5,3, voire supérieur ou égal à 5,5 et encore mieux supérieur ou égal à 6,0 (J/cm³)^{1/2}, voire supérieur ou égale à 7,0 (J/cm³)^{1/2}.

Selon un second mode préféré de réalisation de l'invention, la phase huileuse est apolaire et peut comprendre 5 à 100% en poids, notamment 10-90%, voire 15-60% et encore mieux 20-50% en poids d'une ou plusieurs huiles apolaires (apolaires ou peu polaires); elle présente un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, inférieur à 5,0, notamment inférieur ou égal à 4,9, encore mieux inférieur ou égal à 4,5 et encore mieux inférieur ou égal à 4,0 (J/cm³)^{1/2}.

Les huiles susceptibles d'être employées dans la phase huileuse peuvent être choisies parmi, seule ou en mélange, les huiles d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique; volatiles ou non.

On entend par huile volatile, les huiles ayant, à 25°C, une pression de vapeur comprise entre 0,02 et 300 mm Hg (soit 2,66 à 40000 Pa). De préférence, on utilise des huiles volatiles dont le point éclair est de l'ordre de 30-100°C.

On peut notamment citer :

- les huiles animales ou végétales formées par des esters d'acide gras et de polyols, en particulier les triglycérides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de courge, de pépins de raisin, de sésame, de noisette, d'abricot, d'amandes ou d'avocat; les huiles de poisson, le tricaprocaprylate de glycérol, ou les huiles végétales ou animales de formule R_1COOR_2 dans laquelle R_1 représente le reste d'un acide gras supérieur comportant de 7 à 19 atomes de carbone et R_2 représente une chaîne hydrocarbonée ramifiée contenant de 3 à 20 atomes de carbone, par exemple, l'huile de Purcellin; l'huile de paraffine, de vaseline, de calophyllum, de macadamia, de colza, de coprah, d'arachide, de palme, de ricin, de jojoba, d'olive ou de germes de céréales; l'huile de beurre de karité; le perhydrosqualène;
- les esters et les éthers de synthèse notamment d'acides gras comme les huiles de formule R_1COOR_2 dans laquelle R_1 représente le reste d'un acide gras supérieur comportant de 7 à 29 atomes de carbone et R_2 représente une chaîne hydrocarbonée contenant de 3 à 30 atomes de carbone comme par exemple le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2hexyle, le stéarate d'octyl-2-dodécyle, l'érucate d'octyl-2-dodécyle, l'isononanoate d'isononyl, l'isostéarate d'isostéaryle; les esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate d'octyldodécyle, le diisostéarylmalate, le citrate de triisocétyl, des heptanoates, octanoates, décanoates d'alcools gras; des esters de polyol comme le dioctanoate de propylène glycol, le diheptanoate

de néopentylglycol, le diisononanoate de diéthylèneglycol; les esters du pentaérythritol comme le tétraisostéarate de pentaérythrithyle ; des esters du type trimellitate de tridécyle;

- des alcools gras ayant de 12 à 26 atomes de carbone comme l'octyldodécanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldécanol, le 2-undécylpentadécanol, l'alcool oléique.
- des hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique tels que les huiles de paraffine et leurs dérivés, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que le parléam; les isoparaffines comme l'isohexadécane et l'isodécane ;
- des glycérides et notamment des acétylglycérides ou des triglycérides d'acides gras ayant 4 à 10 atomes de carbone, comme les triglycérides des acides heptanoïque, octanoïque et des acides caprique/caprylique.

Parmi les huiles polaires particulièrement préférées, on peut citer l'octyldodécanol, l'hexyldécanol, l'octyldécanol, l'alcool oléique, l'huile de ricin, le malate de diisostéaryle, le triheptanoate de glycéryle, le trioctanoate de glycéryle, le triglycéride des acides caprique/caprylique, le triisononanoïn, le trimellitate de tridécyle, et leurs mélanges.

Parmi les huiles apolaires particulièrement préférées, on peut citer les hydrocarbures aliphatiques notamment en C6-C40 comme les huiles de paraffine, volatiles, telles que l'isohexadecane ou l'isododécane, ou non volatiles, et leurs dérivés; la vaseline, les polydécènes hydrogénés ou non, le polyisobutène hydrogéné tel que l'huile de Parléam, le squalane, les polybutylènes, l'isononanoate d'isononyle; les huiles fluorées notamment perfluorées, et leurs mélanges.

On peut notamment citer les huiles suivantes :

	$\delta_a \text{ (J/cm}^3\text{)}^{1/2}$
huile de ricin	9,09
2-hexyldécanol	8,55
alcool oléique	8,17
octyldodécanol	7,69
triglycéride de l'acide heptanoïque	7,29
diisostéarylmalate	7,19
triglycéride de l'acide octanoïque	6,87
triglycéride des acides caprique/caprylique	6,69
Triisononanoïn	6,54
Trimellilate de tridécyle	5,35
Isononanoate d'isononyle	4,87
Polyisobutène hydrogéné	0
Isododécane	0

On choisit de préférence la phase huileuse de manière à ce que le ou les colorants organiques photochromes y soient solubles ou dispersibles.

- 5 La phase huileuse est de préférence comprise en une quantité de 1 à 99% en poids, notamment 10 à 90% en poids, de préférence 15 à 80% en poids, par rapport au poids total de la composition cosmétique.

10 La composition selon l'invention peut comprendre en outre d'autres corps gras que les huiles ci-dessus, qui peuvent être choisis par l'homme du métier sur base de ses connaissances générales, de manière à conférer à la composition finale les propriétés souhaitées, par exemple en consistance et/ou en texture.

Ces corps gras additionnels peuvent être des cires, des gommes et/ou des corps gras pâteux d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique, ainsi que leurs
15 mélanges.

Une cire, au sens de la présente invention, est un composé gras lipophile, solide à température ambiante (25°C), à changement d'état solide/liquide réversible, ayant une température de fusion supérieure à 40°C et pouvant aller jusqu'à 200°C, généralement une dureté supérieure à 0,5 MPa, et présentant à l'état so-
20 lide une organisation cristalline anisotrope.

On peut notamment citer les cires d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique telles que les cires microcristallines, la cire de paraffine, le pétrolatum, la vaseline, l'ozokérite, la cire de montan; la cire d'abeilles, la cire de lanoline et ses dérivés; les cires de Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de
25 cacao, les cires de fibres de lièges ou de canne à sucre, la cire de lignite, la cire de son de riz, la cire de sapin, la cire de coton; les huiles hydrogénées ayant une température de fusion supérieure à 40°C (environ), comme l'huile de jojoba hydrogénée; les esters gras et les glycérides concrets à 25°C; les cires de polyéthylène et les cires obtenues par synthèse de Fischer-Tropsch; des huiles hydrogé-
30 nées concrètes à 25°C; des lanolines.

Les corps gras pâteux ont généralement un point de fusion compris entre 25 et 60°C, de préférence entre 30 et 45°C, et/ou une dureté allant de 0,001 et 0,5 MPa, de préférence entre 0,005 et 0,4 MPa. On peut notamment citer les lanolines et leurs dérivés, ou les esters de cholestérol.

35 Ces corps gras additionnels peuvent être présents en une quantité de 0,1-50% en poids, notamment 3-40% en poids, encore mieux 5-30% en poids, par rapport au poids total de la composition.

40 La composition selon l'invention peut être anhydre, ou peut également comprendre une phase aqueuse, qui peut comprendre de l'eau, une eau florale telle que l'eau de bleuet et/ou une eau minérale telle que l'eau de VITTEL, l'eau de LUCAS ou l'eau de LA ROCHE POSAY.

Ladite phase aqueuse peut comprendre de 0,1 à 14% en poids, par rapport au

poids total de la phase aqueuse, d'un monoalcool en C₂-C₆ comme l'éthanol, le propanol, le butanol, l'isopropanol et l'isobutanol.

La composition selon l'invention peut éventuellement comprendre un tensioactif, notamment lorsqu'elle se présente sous forme d'émulsion, de préférence en une

quantité de 0,01 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition. On peut citer, seuls ou en mélange, les sels alcalins, les sels d'ammonium, les sels d'amines ou les sels d'aminoalcools des composés suivants : les alcoylsulfates, alcoyléther sulfates, alcoylamides sulfates et éthers sulfates, alcoylarylpolyéthersulfates, monoglycérides sulfates, alcoylsulfonates, alcoylamides sulfonates, alcoylarylsulfonates, α -oléfines sulfonates, paraffines sulfonates, alcoylsulfo-

succinates, alcoyléthersulfosuccinates, alcoylamides sulfosuccinates, alcoylsulfo-

succinamates, alcoylsulfoacétates, alcoylpolyglycérol carboxylates, alcoylphosphates/alcoylétherphosphates, acylsarcosinates, alcoylpolypeptidates, alcoylamidopolypeptidates, acyliséthionates, alcoyllaurates. Le radical alcoyle ou acyle dans tous ces composés désigne généralement une chaîne de 12 à 18 atomes de carbone.

On peut aussi citer les savons et les sels d'acides gras tels que les acides oléique, ricinoléique, palmitique, stéarique, les acides d'huile de coprah ou d'huile de coprah hydrogénée et notamment les sels d'amines tels que les stéarates d'amines; les acyl lactylates dont le radical acyle comprend 8-20 atomes de carbone; les acides carboxyliques d'éthers polyglycoliques.

On peut encore citer les alcools, les alcoylphénols et acides gras polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés à chaîne grasse comportant 8 à 18 atomes de carbone; des copolymères d'oxydes d'éthylène et de propylène, des condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras, des amides gras polyéthoxylés, des amines grasses polyéthoxylées, des éthanolamides, des esters d'acides gras de glycol, des esters d'acides gras (stéarate, oléate) du sorbitan oxyéthylénés ou non, des esters d'acides gras du saccharose, des esters d'acides gras de polyéthylèneglycol (monostéarate ou monolaurate de polyéthylène glycol); des triesters phosphoriques, des esters d'acides gras de dérivés de glucose; les alkylpolyglycosides et les alkylamides des sucres aminés; les produits de condensation d'un α -diol, d'un monoalcool, d'un alcoylphénol, d'un amide ou d'un diglycolamide avec le glycidol ou un précurseur de glycidol.

On peut également citer le trioleyl phosphate; les ester d'acides gras de polyols comme les mono-, di-, tri- ou sesqui-oléates ou stéarates de sorbitol ou de glycérol, les laurates de glycérol ou de polyéthylène glycol; les alkyl ou alkoxy diméthicones copolyols à chaîne alkyle ou alkoxy pendante ou en bout de squelette siliciné ayant par exemple de 6 à 22 atomes de carbone; les alkyl (lauryl, cétyl, stéaryl, octyl) éthers polyoxyéthylénés et les diméthicones copolyols.

La composition selon l'invention peut encore comprendre un ou plusieurs agents épaississants, par exemple dans des concentrations préférentielles de 0,01 à 6%



: :

en poids par rapport au poids total de la composition. L'agent épaississant peut être choisi parmi, seul ou en mélange :

- les biopolymères polysaccharidiques comme la gomme de xanthane, la gomme de caroube, la gomme de guar, les alginates, les celluloses modifiées telles que l'hydroxyéthylcellulose, la méthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose et la carboxyméthylcellulose, les dérivés de l'amidon, les dérivés d'éthers de cellulose possédant des groupes ammonium quaternaires, les polysaccharides cationiques;
- les polymères synthétiques comme les acides polyacryliques tels que les polymères poly(méth)acrylates de glycéryl tels que l'HISPAGEL ou le LUBRAGEL des sociétés HISPANO QUIMICA ou GARDIAN, la polyvinylpyrrolidone, l'alcool polyvinylique, les polymères réticulés d'acrylamide et d'acrylate d'ammonium tels que le PAS 5161 ou BOZEPOL C de HOECHST; les copolymères acrylate/octylacrylamide tels que le Dermacryl de National Starch; les polymères à base de polyacrylamide tels que le SEPIGEL 305 de SEPPIC, les polymères réticulés d'acrylamide et de chlorure de méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium tels que le SALCARE SC 92 de ALLIED COLLOIDS,
- le silicate de magnésium et d'aluminium;
- les argiles éventuellement modifiées comme les hectorites modifiées par un chlorure d'ammonium d'acide gras en C₁₀ à C₂₂, comme l'hectorite modifiée par du chlorure de di-stéaryl di-méthyl ammonium ;
- la silice éventuellement modifiée;
- les galactomannanes comportant un à six et mieux de deux à quatre groupes hydroxyle par ose, substitués par une chaîne alkyle saturée ou non, comme la gomme de guar alkylée par des chaînes alkyle en C₁ à C₆ et mieux en C₁ à C₃ et plus particulièrement la guar éthylée ayant un degré de substitution de 2 à 3 telle que celle vendue par la société Aqualon sous le nom N-HANCE-AG ;
- les dérivés de cellulose tel que l'éthylcellulose.
- les copolymères séquencés, notamment de type "dibloc" ou "tribloc" du type polystyrène/polyisoprène, polystyrène/polybutadiène, polystyrène/copoly(éthylène-butylène) ou encore polystyrène/copoly(éthylène-propylène) tels que ceux vendus sous le nom de 'Kraton' par Shell Chemical;
- les polymères de type polyamide, par exemple comportant un squelette polymérique ayant des motifs répétitifs amide, et éventuellement au moins une chaîne grasse pendante et/ou au moins une chaîne terminale éventuellement fonctionnalisées, ayant de 8 à 120 atomes de carbone et étant liées à ces motifs amide, parmi lesquels on peut citer les produits commerciaux vendus par la société Arizona Chemical sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100 qui sont un mélange de copolymères d'un diacide en C₃₆ condensé sur l'éthylène diamine, de masse moléculaire moyenne en poids d'environ 6000, les groupes ester terminaux résultant de l'estérification des terminaisons d'acide restantes par l'alcool cétylique, stéarylique ou leurs mélanges (appelés aussi alcool cétylstéarylique).

Selon l'application envisagée, la composition peut comprendre en outre un polymère filmogène. Ceci est généralement le cas lorsque l'on souhaite préparer une composition de type vernis à ongles, mascara, eye-liner ou laque à lèvres.

5 Les polymères peuvent être dissous ou dispersés dans le milieu cosmétiquement acceptable. Les polymères peuvent être présents à une teneur allant de 0,01 % à 40 % en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition peut également comprendre un plastifiant choisi parmi les plastifiants usuels et qui peut être présent à une teneur allant de 0,1 à 40% en poids par rapport au poids total de la composition.

10

La composition peut comprendre en outre une phase particulière, qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilisés dans les compositions cosmétiques.

15 Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorées, minérales ou organiques, destinées à colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minérales ou de synthèse, lamellaires ou non lamellaires, destinées à donner du corps ou de la rigidité à la composition, et/ou de la douceur, de la matité et de l'uniformité au maquillage. Par nacres, il faut comprendre des particules irisées qui réfléchissent la lumière,

20 notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthétisées.

Les pigments peuvent être présents dans la composition à raison de 0,01 à 25% en poids de la composition finale, et de préférence à raison de 3 à 10% en poids. Ils peuvent être blancs ou colorés, minéraux ou organiques, de taille usuelle ou

25 nanométrique. Ils peuvent se présenter sous forme de poudre ou de pâte pigmentaire. On peut citer les oxydes de titane, de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, l'hydrate de chrome, le noir de carbone, les outremers (polysulfures d'aluminosilicates), le pyrophosphate de manganèse et certaines poudres métalliques telles que celles d'argent

30 ou d'aluminium. On peut encore citer les pigments D&C et les laques couramment employées pour conférer aux lèvres et à la peau un effet de maquillage, qui sont des sels de calcium, de baryum, d'aluminium, de strontium ou de zirconium. Les nacres peuvent être présentes dans la composition à raison de 0,01 à 20% en poids, de préférence à un taux de l'ordre de 3 à 10% en poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert d'oxyde de

35 titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane coloré.

Les charges, qui peuvent être présentes à raison de 0,01 à 60% en poids, de préférence 3 à 10%, dans la composition, peuvent être minérales ou de syn-

40 thèse, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de polyéthylène, le Téflon, l'amidon, le nitrure de bore, les microsphères de polymère telles que l'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de résine de silicone (Tospearls de Toshi-



ba, par exemple), le carbonate de calcium précipité, le carbonate ou l'hydrocarbonate de magnésium, des savons métalliques dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 à 22 atomes de carbone.

- 5 La composition peut en outre comprendre un colorant, notamment un colorant organique naturel tel que le carmin de cochenille, et/ou un colorant de synthèse tel que les colorants halogéno-acides, azoïques, anthraquinoniques. On peut également citer des colorants minéraux tels que le sulfate de cuivre ou de fer. On peut encore citer le brun Soudan, le rouge Soudan et le rocou, ainsi que le jus de betterave, le carotène et le bleu de méthylène. Le colorant peut être présent dans
- 10 la composition, seul ou en mélange, à raison de 0,001 à 15% en poids, de préférence 0,01 à 5% en poids et notamment de 0,1 à 2% en poids, par rapport au poids total de la composition.
- 15 La composition peut en outre comprendre un composé photochrome autre que les colorants organiques photochromes de formule (I) ou (II). On peut notamment citer les composés photochromes minéraux, et plus particulièrement les aluminosilicates dopés tels que la sodalite dopée par des halogènes, ou les oxydes ou hydrates métalliques tels que les oxydes de titane rendu photochrome à l'aide
- 20 d'un métal choisi parmi le fer, le chrome, le cuivre, le nickel, le manganèse, le cobalt, le molybdène, tel quel ou sous forme de sel tel qu'un sulfate, un chlorate, un nitrate, un acétate. Le composé photochrome peut être incorporé dans la composition en une quantité de 0,001-20% poids par rapport au poids total de la composition, de préférence en une quantité de 0,1-10% en poids.
- 25 La composition peut en outre comprendre un filtre UV qui peut être incorporé dans la composition en une quantité de 0,01-20% en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence en une quantité de 0,1-10% en poids. On peut notamment citer, parmi les filtres solaires susceptibles d'être employés, les
- 30 composés appartenant aux familles des para-aminobenzoïques; des salicylates; des dibenzoylméthanés; des cinnamates; des dérivés de β,β' -diphénylacrylate; des benzophénones; des benzylidène camphres; des phenyl benzimidazoles; des triazines; des phenyl benzotriazoles; des anthraniliques; des imidazolines et/ou des benzalmalonates.
- 35 La composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilisé dans le domaine cosmétique, tel que des antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des actifs cosmétiques lipophiles ou hydrophiles, des hydratants, des vitamines, des sphingolipides, des agents autobronzants tels que
- 40 la DHA, des azurants optiques, des agents antimousses, des agents séquestrants.

Bien entendu l'homme du métier veillera à choisir les éventuels composés com-

plémentaires, et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée.

- 5 La composition selon l'invention est avantageusement photochrome, c'est-à-dire qu'elle présente un ΔE supérieur ou égal à 5, de préférence supérieur ou égal à 10, mieux supérieur ou égal à 25, encore mieux supérieur ou égal 35, voire supérieur ou égal à 45; le ΔE est mesuré de la manière définie avant les exemples.
- 10 La composition cosmétique selon l'invention trouve notamment une application particulièrement intéressante dans le domaine du maquillage de la peau, des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phanères (ongles, cils, sourcils, poils et cheveux).
- 15 Elle peut comprendre ou se présenter sous la forme d'une suspension, une dispersion notamment d'huile dans de l'eau grâce à des vésicules; une solution huileuse éventuellement épaissie voire gélifiée; une émulsion huile-dans-eau, eau-dans-huile, ou multiple; un gel ou une mousse; un gel huileux ou émulsionné; une dispersion de vésicules notamment lipidiques; une lotion biphasé ou multiphasé;
- 20 un spray; une poudre libre, compacte ou coulée; une pâte anhydre. Cette composition peut avoir l'aspect d'une lotion, d'une crème, d'une pommade, d'une pâte souple, d'un onguent, d'un solide coulé ou moulé et notamment en stick ou en coupelle, ou encore de solide compacté.
- 25 La composition cosmétique selon l'invention peut se présenter sous la forme d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau du corps ou du visage, des lèvres et des cheveux, d'un produit solaire ou autobronzant, voire d'un produit capillaire. Elle trouve une application particulière dans le domaine des rouges à lèvres, des fonds de teint, des fards à joues ou à paupières, des poudres libres ou compactes,
- 30 des crèmes teintées, des produits de maquillage du corps, des produits de coloration de la peau, des eye-liners et des mascaras.

L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants.

35 **Mesure du ΔE**

Les mesures de L, a et b ont été effectuées sur carte de contraste de marque LENETA et de référence FORM 1A PENOPAC, pour un étalement de composition de 50 microns d'épaisseur.

- 40 Les mesures en réflexion ont été effectuées grâce à un spectrocolorimètre MINOLTA 3700D.

On a ainsi déterminé les coordonnées trichromatiques initiales de la composition

avant irradiation (L_0 , a_0 et b_0). On a ensuite soumis la composition à une irradiation aux UV (flux de 2 mW/cm^2 d'un rayonnement UVA) pendant deux minutes puis aussitôt après l'arrêt de l'irradiation, déterminé les coordonnées trichromatiques après irradiation (L , a et b). Il s'est écoulé moins de 5 secondes entre l'arrêt de l'irradiation et la détermination des nouvelles coordonnées.

On a alors calculé le ΔE de la manière suivante :

$$\Delta E = [(L - L_0)^2 + (a - a_0)^2 + (b - b_0)^2]^{1/2}$$

- 10 Lorsque l'on mesure le ΔE d'un colorant et non d'une composition le comprenant, on effectue la mesure sur une solution comprenant 0,05% en poids de colorant dans du malate de diisostéaryle. Puis on effectue la mesure comme indiqué ci-dessus.

15 **Exemple 1**

On a déterminé le ΔE (avant et après irradiation UV pendant 2 minutes) de différents colorants photochromes selon l'invention, à 1% en poids dans une base blanche de rouge à lèvres comprenant :

20	- octyl-2 dodecanol	0,5%
	- hectorite modifiée par chlorure de di-stearyl di-methyl ammonium	0,6%
	- lanoline liquide	27,2%
	- cire microcristalline	10,5%
25	- cire d'abeille polyglycérolée (3 moles)	4,2%
	- lanoline acétylée	6,7%
	- huile d'arara (esters d'acide oléique)	13,5%
	- cire de lanoline oxypropylénée (5 op)	6,7%
	- érucate d'oléyle	13,5%
30	- triglycérides d'acides oléique-linoléique-linoléique	1,7%
	- triglycérides d'acides palmitique-oléique-linoléique	13,5%
	- hyaluronate de sodium	0,1%
	- conservateurs	0,1%
	- vitamine	0,5%
35	- filtre UV	0,7%

On prépare donc une composition comprenant donc 1% de colorant selon l'invention et 99% de la base ci-dessus.

- 40 Les mesures de L , a et b ont été effectuées sur carte de contraste de marque LENETA et de référence FORM 1A PENOPAC, pour un étalement de composition de 50 microns d'épaisseur.

Les mesures en réflexion ont été effectuées grâce à un spectrophotomètre MINOLTA 3700D.

On a ainsi déterminé les coordonnées trichromatiques initiales de la composition avant irradiation (L_0 , a_0 et b_0). On a ensuite soumis les compositions à une irradiation aux UV (flux de 2 mW/cm² d'un rayonnement UVA) pendant deux minutes puis aussitôt après l'arrêt de l'irradiation, déterminé les coordonnées trichromatiques après irradiation (L , a et b). Il s'est écoulé moins de 5 secondes entre l'arrêt de l'irradiation et la détermination des nouvelles coordonnées.

10 On a alors calculé le ΔE de la manière suivante :

$$\Delta E = [(L - L_0)^2 + (a - a_0)^2 + (b - b_0)^2]^{1/2}$$

On obtient les résultats suivants :

Colorant	ΔE
3,3-di(4-methoxyphenyl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran	51
3-phényl-3-(4-morpholinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran	53
3-phényl-3-(4-piperidinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran	49

15

Une mesure de ΔE supérieure à 30 environ signifie que le colorant donne une couleur vive; on constate que cela est particulièrement le cas avec les colorants selon l'invention testés ici.

20 Exemple 2

Afin de mettre en évidence le solvatochromisme des colorants selon l'invention, c'est dire l'influence de la nature de l'huile sur l'expression colorielle desdits colorants photochromes, sans exposition aux UV, on a préparé plusieurs mélanges simplex comprenant 0,05% en poids de 3-phényl-3-(4-pypéridinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran (Reversacol Ruby de James Robinson) dans différentes huiles.

25

On a ainsi déterminé les coordonnées trichromatiques (L_h , a_h et b_h) de l'huile seule et du mélange huile + colorant (L_m , a_m et b_m) et calculé le $\Delta E'$ de la manière suivante: $\Delta E' = [(L_h - L_m)^2 + (a_h - a_m)^2 + (b_h - b_m)^2]^{1/2}$

30

Pour ce faire, on a employé un spectrophotomètre Minolta 3700D en mode transmission, avec une cuve en plastique (trajet optique "parois cuve + huile + éventuellement colorant " = 1 cm).

35

On obtient les résultats suivants :

Huile	δ_a de l'huile seule (J/cm ³) ^{1/2}	$\Delta E'$ du mélange huile + colorant
huile de ricin	9,09	33,6278
Octyldodécanol	7,69	37,6049
Diisostéarylmalate	7,19	12,9041
triglycéride des acides caprique/caprylique	6,69	12,4093
Triisononanoïn	6,54	12,8122
Trimellilate de tridécyle	5,35	14,2178
Isononanoate d'isononyle	4,87	7,7386
Polyisobutène hydrogéné	0	6,6920
Isododécane	0	4,2421

- 5 On constate donc que l'effet solvatochrome, à savoir la modification de la couleur par l'huile, est d'autant plus important que l'huile est polaire.

Exemple 3

- 10 Les mélanges préparés dans l'exemple 2 ont été irradiés aux UV (flux de 2 mW/cm² d'UVA) pendant 2 minutes.

On a ensuite à nouveau déterminé, comme à l'exemple 2, les coordonnées tri-chromatiques du mélange, après irradiation (L_m' , a_m' et b_m') et calculé le ΔE de la manière suivante :

- 15 $\Delta E = [(L_m' - L_m)^2 + (a_m' - a_m)^2 + (b_m' - b_m)^2]^{1/2}$

Il s'est écoulé moins de 5 secondes entre l'arrêt de l'irradiation et la détermination des nouvelles coordonnées.

On obtient les résultats suivants :

20

Huile	ΔE
huile de ricin	19,02
octyldodécanol	20,88
diisostéarylmalate	38,79
triglycéride des acides caprique/caprylique	23,70
Triisononanoïn	21,62
Trimellilate de tridécyle	13,74
Isononanoate d'isononyle	25,47
Polyisobutène hydrogéné	17,69

Isododécane	19,17
-------------	-------

On constate donc bien que l'effet photochrome existe bien pour le colorant solubilisé dans différents huiles.

5 **Exemple 4**

On a ajouté aux mélanges préparés à l'exemple 2 (huiles + 0,05% en poids de colorant Reversacol Ruby) 15 % en poids de cire de polyéthylène (cire apolaire), puis on a mesuré, avant et après irradiation 2 minutes aux UV (flux de 2 mW/cm² d'UVA), les coordonnées trichromatiques L,a,b sur des films minces de composition, d'épaisseur 50 microns, coulés sur carte de contraste.

Pour ce faire, on a employé un spectrocolorimètre Minolta 3700D en mode réflexion; il s'est écoulé moins de 5 secondes entre l'arrêt de l'irradiation et la détermination des nouvelles coordonnées.

Comme précédemment, on a calculé le ΔE et on obtient les résultats suivants :

Nature de l'huile dans la composition (15% de cire + 0,05% de colorant)	ΔE
huile de ricin	26,75
octyldodécanol	31,09
diisostéarylmalate	43,12
Triisononanoïn	33,70
Trimellilate de tridécyle	31,98
Isononanoate d'isononyle	27,74
Polyisobutène hydrogéné	18,36
Isododécane	27,21

On constate donc que l'effet photochrome existe toujours dans un système structuré, c'est-à-dire en présence d'une cire.

Exemple 5

On a préparé un gloss apolaire pour les lèvres comprenant (% en poids):

- Reversacol Ruby 0,05%
- polybutylène ($\delta_a = 0$) 99,95%

On obtient un gel de couleur initiale saumon très léger, qui devient saumon soutenu après exposition quelques secondes au soleil. L'effet photochrome est net, d'autant plus que la composition de départ est peu colorée et transparente. La

rapidité de l'effet à l'excitation aux UV comme à la relaxation est remarquable.

Exemple 6

- 5 On a préparé un gloss polaire pour les lèvres comprenant (% en poids):
- Reversacol Ruby 0,2%
 - octyl-2 dodécanol 10%
 - silice pyrogénée 6%
 - huile de ricin qsp 100%
- 10 δ_a de la phase huileuse $> 7 \text{ (J/cm}^3\text{)}^{1/2}$

On obtient un gel semi-épais de couleur initiale grenat foncé. L'effet solvatochrome est très visible.

Exemple 7

- On a préparé un stick pour les lèvres comprenant (% en poids):
- Reversacol Ruby 0,2%
 - cire de polyéthylène 15%
 - 20 - polyisobutène hydrogéné ($\delta_a = 0$) qsp 100%

On obtient un stick de couleur initiale blanc très légèrement orangé qui devient orangé foncé très soutenu après exposition quelques secondes au soleil. Le retour à la couleur initiale est également rapide.

25

Exemple 8

- On a préparé un stick pour les lèvres comprenant (% en poids):
- Reversacol Ruby 0,05%
 - 30 - octyl-2 dodécanol 10%
 - huile de lanoline fluide 10%
 - cire de polyéthylène 15%
 - huile de ricin qsp 100%


- 35 On obtient un stick de couleur initiale rose clair qui devient orangé foncé très soutenu après exposition quelques secondes au soleil.
- On constate un effet photochrome très important avec une qualité importante de retour à l'état non excité en terme de rapidité et de recouvrance de l'absence de couleur (le retour se fait comme l'excitation en quelques secondes).

40


: :

REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins une phase huileuse et au moins un colorant de formule (I) ou (II) :



(I)



(II)

dans lesquelles :

* R1 représente :

- (i) un atome d'hydrogène;
- (ii) un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, voire 1-6, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;

- (iii) un cycle hydrocarboné formé avec l'une des liaisons "f" ou "gh" et le radical R7; ou

- (iv) un groupement choisi parmi -COOR4, -C(O)NR2R3, -NR2R3, -OR4 et -SR4, dans lequel :

- R2 et R3 soit représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-12, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P,

- soit pris ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont reliés, forment un hétérocycle hydrocarboné, saturé ou insaturé, comportant 3-10, de préférence 4-6, atomes de carbone et éventuellement 1-5 autres hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, ledit cycle étant éventuellement substitué par au moins un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, comportant éventuellement 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;


- R4 représente un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence

1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl, et/ou éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

5

* R5 et R6 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi :

- (i) les groupements aminoaryles cycliques saturés de formule (IIa) ou (IIb) :



10

(IIa)


(IIb)

15

dans lesquelles le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 3 à 30 atomes, de préférence 4-10 et encore mieux 5, 6 ou 7 atomes, inclus l'azote, le reste étant des atomes de carbone et/ou des hétéroatomes choisis parmi O, S, Si, P et/ou des groupements choisis parmi -NH et -NR avec R représentant un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

20


- (ii) les groupements indolinoaryles de formule (III) :



(III)

dans laquelle R10 et R11 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupe-
 ment choisi parmi (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préfé-
 5 rence 1-18, et mieux 1 à 12, voire 1-6, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou
 cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes
 choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné,
 notamment par F, Br et/ou Cl; (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br
 et/ou Cl; (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); (iv)
 10 un atome d'hydrogène; (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -
 OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus; (vi)
 les radicaux R10 et R11 pouvant former ensemble un cycle hydrocarboné saturé
 ou insaturé ayant au total 5 à 8 atomes (incluant les atomes du cycle indoline),
 lesdits atomes étant choisis parmi C, O, S et/ou NR avec R représentant H ou un
 15 radical hydrocarboné ayant 1 à 20 atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cycli-
 que, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis
 parmi N, O, S, Si et P,

- (iii) les groupements de formule (IV) :




(IV)


dans laquelle m et p sont, indépendamment l'un de l'autre, des entiers allant de 2
 à 5;

- (iv) les groupements aminoaryles cycliques insaturés de formules (Va),


(Vb) ou (Vc) :



(Va)



(Vb)



(Vc)

- 5 dans lesquelles R8 et R9, représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, voire 1-6, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl; (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl; (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); (iv)
- 10 un atome d'hydrogène; (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;
- 15 - (v) un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 2-18, et mieux 3 à 12, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P; et notamment un groupement choisi parmi -C₆H₄-CONR₂R₃, -C₆H₄-NR₂R₃ et -C₆H₄-OR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;
- 20

* R7 représente un groupement choisi parmi :

- (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P,

et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;

- (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl;

- (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); -N=N- (azo); =NH (imino); -CONH₂ (amide);

5 - (iv) un atome d'hydrogène;

- (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;

- (vi) le radical R₇ pouvant en outre former, avec l'une des liaisons "i", "j", "k", ou "g,h" prises avec le radical R₁, ou "f" prise avec le radical R₁, un cycle hydrocar-

10 boné saturé ayant au total 3 à 8, de préférence 4 à 7, et mieux 5 ou 6, atomes de carbone, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

* R'₁ représente un groupement choisi parmi :

15 - (i) un atome d'hydrogène;

- (ii) un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;

20 - (iii) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ et -SR₄, avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus;

* R'₂ représente un groupement choisi parmi :

- (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;


- (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl;

- (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); -N=N- (azo); =NH (imino); -CONH₂ (amide);


30 - (iv) un atome d'hydrogène;

- (v) un groupement choisi parmi -C(O)NR₂R₃, -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données ci-dessus.

35 2. Composition selon la revendication 1 dans laquelle le colorant organique photochrome répond à l'une des formules (Ia) et (IIa) suivantes :




(Ia)




(IIa)

dans lesquelles R₁, R₅, R₆, R₇, R'₁ et R'₂ sont définis comme dans la revendication 1.

- 5 3. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle R₁ représente un atome d'hydrogène; un cycle hydrocarboné avec l'une des liaisons "f" ou "gh" et le radical R₇; ou un groupement choisi parmi -COOR₄, -NR₂R₃, -OR₄ et -SR₄, dans lequel :
- 10 - R₂ et R₃ soit représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, soit pris ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont reliés, forment un hétérocycle hydrocarboné, saturé ou insaturé, comportant 3-10, de préférence 4-6, atomes de carbone et éventuellement 1-5 autres hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, ledit cycle étant éventuellement substitué par au moins un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, comportant éventuellement 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;
- 15 - R₄ représente un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl, et/ou éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P.
- 20
- 25 4. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle R₅ et R₆ représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement choisi parmi :
- les groupements aminoaryles cycliques saturés de formule (IIa) ou (IIb) :



(IIa)




(IIb)

- dans lesquelles le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 3 à 30 atomes, de préférence 4-10 et encore mieux 5, 6 ou 7 atomes; inclus l'azote, le reste étant des atomes de carbone et/ou des hétéroatomes choisis parmi O, S, Si, P et/ou des groupements choisis parmi -NH et -NR avec R représentant un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;
- un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 2-18, et mieux 3 à 12, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P; et notamment un groupement choisi parmi -C₆H₄-CONR₂R₃, -C₆H₄-NR₂R₃ et -C₆H₄-OR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données en revendication 1.
5. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle R₇ représente un groupement choisi parmi :
- (i) les groupements hydrocarbonés ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl;
 - (ii) les atomes d'halogène, et notamment F, Br et/ou Cl;
 - (iii) les groupements -CN (nitrile), -COOH (carboxylate), -NO₂ (nitro); -N=N- (azo); =NH (imino); -CONH₂ (amide);
 - (iv) un atome d'hydrogène;
 - (v) un groupement choisi parmi -NR₂R₃, -OR₄ ou -SR₄ avec R₂, R₃ et R₄ ayant les significations données en revendication 1;
 - (vi) le radical R₇ pouvant en outre former, avec l'une des liaisons "i", "j", "k", ou "g,h" prises avec le radical R₁, ou "f" prise avec le radical R₁, un cycle hydrocarboné saturé ayant au total 3 à 8, de préférence 4 à 7, et mieux 5 ou 6, atomes de carbone, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S,


Si et P.

6. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle R'1 représente l'hydrogène ou un groupement hydrocarboné ayant 1 à 30, de préférence 1-18, et mieux 1 à 12, atomes de carbone, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, et/ou éventuellement halogéné ou perhalogéné, notamment par F, Br et/ou Cl.
7. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle R'2 représente l'hydrogène ou un groupement choisi parmi $-\text{NO}_2$, $-\text{NR}_2\text{R}_3$ et $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_2\text{R}_3$, dans lesquels R2 et R3, soit représentent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-12, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P; soit pris ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont reliés, forment un hétérocycle hydrocarboné, saturé ou insaturé, comportant 3-10, de préférence 4-6, atomes de carbone et éventuellement 1-5 autres hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P, ledit cycle étant éventuellement substitué par au moins un radical hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, comportant éventuellement 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P.
8. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le colorant organique est de formule (I) ou (Ia) pour lesquelles :
- * R1 représente l'hydrogène; ou un groupement $-\text{COOR}$ avec R étant un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle; ou un groupement




et/ou

* R5 et R6 représentent, indépendamment l'un de l'autre, soit (i) un groupement de formule (IIa) :




(IIa)

dans laquelle le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 4 à 7 atomes, notamment 5 ou 6 atomes, inclus l'azote, et notamment 3-5 atomes de carbone et 0-1 atome d'oxygène; et en particulier un groupement de formule:



soit (ii) un groupement hydrocarboné ayant 5 à 14, de préférence 6 à 10 atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 2 hétéroatomes choisis parmi N, O ou S;

10 en particulier un groupement



dans lesquelles R est un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle; et R2 et R3 sont, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis parmi N, O, S, Si et P;

et/ou


* R7 représente un atome d'hydrogène ou un groupement -NR₂R₃, avec R2 et R3 représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné saturé, linéaire ou ramifié, ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un groupement méthyle et/ou éthyle.

9. Composition selon l'une des revendications 1 à 7, dans laquelle le colorant organique est de formule (II) ou (IIa) pour lesquelles :

* R'1 représente l'hydrogène ou un groupement -COOR avec R étant un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle;


et/ou

* R5 et R6 représentent, indépendamment l'un de l'autre, soit (i) un groupement de formule (IIa) :




(IIa)


- 5 dans laquelle le cycle comportant N et X est un cycle saturé qui comprend au total 4 à 7 atomes, notamment 5 à 6 atomes, inclus l'azote, et notamment 4-5 atomes de carbone et 0-1 atome d'oxygène; et en particulier un groupement de formule:




ou




ou




- 10 soit (ii) un groupement hydrocarboné ayant 5 à 14, de préférence 6 à 10 atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 2 hétéroatomes choisis parmi N, O ou S; en particulier un groupement :



ou




ou




- 15 dans lesquelles R est un radical hydrocarboné saturé ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un radical méthyle ou éthyle; et R2 et R3 sont, indépendamment l'un de l'autre, un groupement hydrocarboné ayant 1 à 20, de préférence 1-15, et mieux 1 à 6, atomes de carbone, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, éventuellement comportant 1 à 5 hétéroatomes choisis
20 parmi N, O, S, Si et P; et/ou


- * R'2 représente l'hydrogène, ou un groupement -NR'R'' avec R' et R'', identiques ou différents, représentant un groupement hydrocarboné saturé, linéaire ou ramifié, ayant 1 à 12, de préférence 1-6, atomes de carbone, et notamment un groupement méthyle et/ou éthyle; ou un groupement
25




10. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le colorant organique est choisi parmi :
- 5 - le 3,3-di(4-méthoxyphényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :



- 10 - le 3-phényl-3-(4-morpholinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :




- 15 - le 3-phényl-3-(4-pipéridinophényl)-6-morpholino-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :




- le 3-phényl-3-(4-pipéridinophényl)-6-carboxyméthyl-9-N-diméthyl-3H-naphto[2,1-b]pyran de formule :

5



10 - le 2-phényl-2-(4-pipéridinophényl)-5-carboxyméthyl-9-N-diméthyl-2H-naphto[1,2-b]pyran de formule :



- leurs mélanges.

15

11. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le colorant organique selon l'invention est compris, seul ou en mélange, en une quantité de 0,001 à 20% en poids, notamment de 0,005 à 10 % en poids, de préférence 0,01 à 5% en poids, et encore mieux de 0,05 à 2% en poids, préférentiellement de 0,1 à 1% en poids, par rapport au poids total de la composition cosmé-

20

tique.

12. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la phase huileuse est polaire et présente un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, supérieur ou égal à 5,0 (J/cm³)^{1/2}, notamment supérieur ou égal à 5,3, voire supérieur ou égal à 5,5 et encore mieux supérieur ou égal à 6,0 (J/cm³)^{1/2}, voire supérieur ou égale à 7,0 (J/cm³)^{1/2}.
13. Composition selon l'une des revendications précédentes dans laquelle la phase huileuse comprend 5 à 100% en poids, notamment 10-90%, voire 15-60% et encore mieux 20-50% en poids du poids total de ladite phase huileuse, d'une ou plusieurs huiles polaires ayant un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, supérieur ou égal à 5,0 (J/cm³)^{1/2}.
14. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, dans laquelle la phase huileuse est apolaire et présente un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, inférieur à 5,0, notamment inférieur ou égal à 4,9, encore mieux inférieur ou égal à 4,5 et encore mieux inférieur ou égal à 4,0 (J/cm³)^{1/2}.
15. Composition selon l'une des revendications 1-11 et 14, dans laquelle la phase huileuse comprend 5 à 100% en poids, notamment 10-90%, voire 15-60% et encore mieux 20-50% en poids du poids total de ladite phase huileuse, d'une ou plusieurs huiles apolaires ayant un paramètre moyen de solubilité δ_a selon l'espace de solubilité de Hansen, à 25°C, inférieur à 5,0 (J/cm³)^{1/2}.
16. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la phase huileuse comprend au moins une huile choisie parmi :
 - les huiles animales ou végétales formées par des esters d'acide gras et de polyols, en particulier les triglycérides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de courge, de pépins de raisin, de sésame, de noisette, d'abricot, d'amandes ou d'avocat; les huiles de poisson, le tricaprocaprylate de glycérol, ou les huiles végétales ou animales de formule R₁COOR₂ dans laquelle R₁ représente le reste d'un acide gras supérieur comportant de 7 à 19 atomes de carbone et R₂ représente une chaîne hydrocarbonée ramifiée contenant de 3 à 20 atomes de carbone, par exemple, l'huile de Purcellin; l'huile de paraffine, de vaseline, de calophyllum, de macadamia, de colza, de coprah, d'arachide, de palme, de ricin, de jojoba, d'olive ou de germes de céréales; l'huile de beurre de karité; le perhydrosqualène;
 - les esters et les éthers de synthèse notamment d'acides gras comme les huiles de formule R₁COOR₂ dans laquelle R₁ représente le reste d'un acide gras supérieur comportant de 7 à 29 atomes de carbone et R₂ représente une chaîne hydrocarbonée contenant de 3 à 30 atomes de carbone comme par exemple le my-

- ristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, le stéarate d'octyl-2-dodécyle, l'érucate d'octyl-2-dodécyle, l'isononanoate d'isononyle, l'isostéarate d'isostéaryle; les esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate d'octyldodécyle, le diisostéarylmalate, le
- 5 citrate de triisocétyle, des heptanoates, octanoates, décanoates d'alcools gras; des esters de polyol comme le dioctanoate de propylène glycol, le diheptanoate de néopentylglycol, le diisononanoate de diéthylèneglycol; les esters du pentaérythritol comme le tétraisostéarate de pentaérythrithyle ; des esters du type trimellitate de tridécyle;
- 10 - des alcools gras ayant de 12 à 26 atomes de carbone comme l'octyldodécanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldécanol, le 2-undécylpentadécanol, l'alcool oléique.
- des hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique tels que les huiles de paraffine et leurs dérivés, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que le parléam; les isoparaffines comme
- 15 l'isohexadécane et l'isodécane ;
- des glycérides et notamment des acétylglycérides ou des triglycérides d'acides gras ayant 4 à 10 atomes de carbone, comme les triglycérides des acides heptanoïque, octanoïque et des acides caprique/caprylique.
- 20 17. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la phase huileuse comprend au moins une huile choisie parmi l'octyldodécanol, l'hexyldécanol, l'octyldécanol, l'alcool oléique, l'huile de ricin, le malate de diisostéaryle, le triheptanoate de glycéryle, le trioctanoate de glycéryle, le triglycéride des acides caprique/caprylique, le triisononanoïn, le trimellitate de tridécyle, les
- 25 hydrocarbures aliphatiques notamment en C6-C40 comme les huiles de paraffine, volatiles, telles que l'isohexadécane ou l'isododécane, ou non volatiles, et leurs dérivés; la vaseline, les polydécènes hydrogénés ou non, le polyisobutène hydrogéné tel que l'huile de Parléam, le squalane, les polybutylènes, l'isononanoate d'isononyle; les huiles fluorées notamment perfluorées, et leurs mélanges.
- 30 18. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la phase huileuse est comprise en une quantité de 1 à 99% en poids, notamment 10 à 90% en poids, de préférence 15 à 80% en poids, par rapport au poids total de la composition cosmétique.
- 35 19. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre d'autres corps gras choisis parmi les cires, les gommes et/ou les corps gras pâteux d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique, ainsi que leurs mélanges.
- 40 20. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre une phase particulière, qui peut comprendre des pigments et/ou des nacrés et/ou des charges; et/ou des colorants; et/ou des composés photochromes autre

que les colorants organiques photochromes de formule (I) ou (II); et/ou des filtres UV.

21. Composition selon l'une des revendications précédentes, présentant un ΔE
5 supérieur ou égal à 5, de préférence supérieur ou égal à 10, mieux supérieur ou égal à 25, encore mieux supérieur ou égal 35, voire supérieur ou égal à 45.
22. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous
10 la forme d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau du corps ou du visage, des lèvres et des cheveux, d'un produit solaire ou autobronzant, voire d'un produit capillaire.
23. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous
15 la forme d'un rouge à lèvres, d'un fond de teint, d'un fard à joues ou à paupières, d'une poudre libre ou compacte, d'une crème teintée, d'un produit de maquillage du corps, d'un produit de coloration de la peau, d'un eye-liner ou d'un mascara.
24. Procédé de traitement cosmétique d'un support choisi parmi les muqueuses,
20 les semi-muqueuses, la peau et/ou les phanères, dans lequel on applique sur ledit support une composition cosmétique telle que définie dans l'une des revendications 1 à 23.
25. Procédé de maquillage et/ou de coloration temporaire d'un support choisi
25 parmi les muqueuses, les semi-muqueuses, la peau et/ou les phanères, dans lequel on applique sur ledit support une composition cosmétique telle que définie dans l'une des revendications 1 à 23.



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ... / ...

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		OA02312/BN/CD	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0213003	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition cosmétique comprenant une phase huileuse et un colorant de type naphthopyranne, et procédés de traitement cosmétique			
LE(S) DEMANDEUR(S) : L'ORÉAL 14, rue Royale 75008 PARIS France			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		BLIN	
Prénoms		Xavier	
Adresse	Rue	24, rue de Staël	
	Code postal et ville	75015	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		SIMON	
Prénoms		Jean-Christophe	
Adresse	Rue	80, Boulevard de Reuilly	
	Code postal et ville	75012	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (N m et qualité du signataire) 18 Octobre 2002 Catherine DODIN			